



مستشفى الملك فيصل التخصصي
علاقة المجتمع - التثقيف الصحي
ومركز الأبحاث

الربو والمرأة الحامل

إعداد الدكتور

حرب الهرفي

الموسن الثقافي
م ٢٠٠٣ - ١٤٢٤



المركز الوطني للحساسية والربو والمناعة
تميّز في تشخيص وعلاج الحساسية والربو

شارع التخصصي - الرياض
هاتف : ٤٨٠٣٣٣٣ فاكس : ٤٨٠٤٨٠
بريد إلكتروني : info@allergyarabia.com
موقع : www.allergyarabia.com

الجرعات أثناء الحمل خوفاً من حدوث ردّة فعل تحسّسية مع
أنها نادرة الحدوث .

٩- هل هناك ضرر من إرضاع الطفل إذا كانت المرأة
تعاني من الربو ؟

ليس هناك فرق بين من تعاني من الربو وغيرها من حيث
إرضاع الطفل حيث أن أدوية الربو وأدوية الحساسية الأخرى
ليس لها ضرر على الرضيع بشكل عام .

وباختصار فإن علاج الربو بشكل جيد أثناء الحمل
ضروري لصحة الأم ولصحة جنينها ونموه . وعلى العكس
فإن هناك خطر على الأم وعلى الجنين إذا لم يعالج الربو أثناء
الحمل وخاصة إذا أدى الربو إلى نقص الأكسجين في الدم مما
قد يؤدي إلى ضعف نمو الجنين أو لريما الإجهاض . وقد تبين
من دراسات عديدة أنه ليس هناك فرق في نتيجة الحمل بين
المرأة التي تعاني من الربو إذا عولجت بشكل فعال وبين المرأة
التي لا تعاني من الربو .

إعداد
الاستاذ الدكتور / حرب الهرفي

تمت الطباعة بتمويل من :

المركز الوطني للحساسية والربو والمناعة
NATIONAL CENTER OF ALLERGY, ASTHMA & IMMUNOLOGY "NCAAI"

٥- في أي مرحلة من الحمل يتغير الريبو ؟

غالباً ما تزداد شدة الريبو في الأشهر الأخيرة من الحمل وذلك بسبب ارتفاع حجم الجنين وضغطه على الحجاب الحاجز وبالتالي فإن مساحة تمدد الرئة يصبح أقل . وعلى كل حال ، فإن المرأة الحامل قد تشعر بالتحسن في آخر أربع أسابيع من الحمل . ونادراً ما يشتد الريبو أثناء الطلاق أو الولادة إذا عولج بشكل جيد أثناء الحمل .

٦- لماذا يخف الريبو عند بعض النساء أثناء الحمل ؟

إن السبب غير معروف بشكل مؤكّد ولكن يعتقد أن ارتفاع الكورتيزون في جسم المرأة الحامل هو أحد الأسباب .

٧- لماذا تزداد شدة الريبو عند بعض النساء أثناء الحمل ؟

أثناء الحمل قد يحدث ارتخاء في باب المعدة ، وارتفاع المحوضة والحرقة وأعراض أخرى . فوجود المحوضة والتهاب الجيوب والضغوط النفسية للحمل قد يؤدي إلى اشتداد الريبو . وكثيراً ما يزداد الريبو نتيجة نزلات البرد والزكام أثناء الحمل .

٨- وماذا عن تطعيم الحساسية أثناء الحمل ؟

إن إبرة الحساسية أو تطعيم الحساسية ليس له أثر ضار على الحمل وعليه يجب الاستمرار في التطعيم ، ولكن يجب عدم البدء بالتطعيم الجديد أثناء الحمل إذا لم تكن المرأة قد ابتدأت به قبل حدوث الحمل . ويجب الحرص في إعطاء

٢- لماذا يؤثر الريبو على الجنين إذا لم يعالج بشكل فعال ؟

حالة الريبو التي لا تعالج بشكل فعال تؤدي إلى نقص الأكسجين في الدم . ونحن نعرف أن الجنين يعتمد كلياً على دم الأم للحصول على الأكسجين . فإذا نقص الأكسجين في دم الأم فإن نمو الجنين وصحته يتاثران وربما يؤدي إلى الإجهاض .

٣- هل أدوية الريبو تضر الجنين ؟

الملحوظ أن أدوية الريبو التي تعطي للام لا تؤثر على الجنين ولا تؤدي إلى تشوّهات . إن علاج الآلاف من النساء الحوامل بينت أن أدوية الريبو لا تؤثر على الجنين ، وأن خطر الريبو الذي لم يعالج بشكل جيد أثناء الحمل هو أكبر من خطرأخذ أدوية الريبو . وعلى كل حال فإن الطبيب الأخصائي يختار الأدوية بعناية أثناء الحمل . وعلى العموم فإن جميع الأدوية التي تعطي عن طريق البخاخات أو الاستنشاق ليس لها ضرر على المرأة الحامل .

٤- ما هو تأثير الحمل على الريبو ؟

أن الحمل ربما يؤثر على شدة الريبو . ففي بعض الدراسات لوحظ أن الريبو يزداد في الشدة أثناء الحمل في ٣٥٪ من الحالات ، ويتحسن أثناء الحمل عند ٢٨٪ من الحالات ، ويبقى كما هو عند ٣٣٪ من الحالات . ومعنى هذا أن بعض حالات الريبو تزداد نتيجة الحمل والبعض الآخر يتحسن والبعض لا يزداد ولا يتحسن بل يبقى كما هو .

إن المعلومات المتوفرة لدينا تبين أن الريبو أثناء الحمل يمكن أن يؤثر على صحة الأم وصحة الجنين ونموه . إن أهداف علاج الريبو أثناء الحمل هي نفس الأهداف لغير المرأة الحامل ، أي لمنع نوبات الريبو التي تؤدي إلى دخول المستشفى أو زيارة الطوارئ أو التغيب عن العمل أو العجز المزمن . وعليه فإن علاج الريبو ، سواء كانت المرأة حاملاً أو غير حامل ، هو نفس العلاج دون اختلاف .

فالمرأة الحامل يجب أن تتجنب مهيجات الريبو كالتدخين والروائح القوية ومسبات الحساسية الأخرى ، ويجب اختيار الأدوية التي لا تؤثر على الأم أو الجنين . وفي هذا المجال فإن الغالبية العظمى من الأدوية المستعملة لعلاج الريبو والحساسية ليس لها أضرار على الأم أو الجنين .

بعض التساؤلات الشائعة حول الريبو أثناء الحمل:

١- ما هي نتيجة الحمل عند المرأة التي تعاني من الريبو ؟

إن المعلومات الحديثة المتوفرة تدل على أن الريبو إذا عولج بطريقة جيدة فليس هناك خوف من المضاعفات سواء على الأم أو الجنين كما أنه تبين أن هناك علاقة وثيقة بين نقص وزن الجنين وبين الريبو الذي لم يعالج بشكل فعال أثناء الحمل . وعليه فيجب علاج الريبو بشكل جيد ويجب أن تعطي الأدوية اللازمة ومن ضمنها الكورتيزون سواء بالفم أو الحقن أو الاستنشاق دون الخوف من المضاعفات ما دامت أعراض الريبو مسيطر عليها بشكل فعال .